




Maladie rénale chronique
Je dépiste simplement,
je protège efficacement

La Maladie Rénale Chronique (MRC) est plus fréquente qu'on ne le pense. **Un patient sur quatre de plus de 65 ans est concerné**

Le dépistage est simple :

aux stades initiaux (2 et 3A), il faut agir. Une prise en charge active évite la progression vers les stades avancés et prévient les complications cardio-vasculaires.

Qui dépister ?



**Diabète et maladies
cardio-vasculaires¹**



**Affections
urologiques²**



**Maladies de système,
maladies auto-immunes**



**Antécédents personnels
ou familiaux
de maladie rénale**



Obésité



**Exposition
aux traitements et
produits néphrotoxiques³**

Les urines des 24h, j'oublie.

Je prescris le RAC. En fonction du résultat, je prescris un médicament et/ou je prends un avis néphrologique.


¹ - HTA, cardiopathie, pathologie vasculaire, athéromateuse

² - Malformation urinaire, infections urinaires à répétition

³ - AINS, chimiothérapie, produit de contraste iodé, radiothérapie ciblant l'aire rénale, toxiques professionnels (plomb, cadmium, mercure)

L'évaluation systématique des symptômes associés à la MRC **est indispensable**

Il faut noter qu'ils ne sont pas intuitivement associés à la MRC, car **les reins font parler d'eux indirectement**.
Il faut donc expliquer au patient les symptômes qui peuvent survenir pour rechercher avec lui des solutions pour le soulager.



Source : The KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease (CKD) : CKD Evaluation and Management – KDIGO

Je protège efficacement

En consultation, je peux montrer la courbe du DFG au patient pour évaluer la stabilité de son état rénal.
La dégradation n'est pas inéluctable.



Avis néphrologique

Nouveaux traitements
néphroprotecteurs

Cibles
non-
atteintes



iSGLT2

En sus d'un traitement par bloqueurs
du SRA à doses maximales tolérées ou
si CI aux IEC / ARAII

Si DFG < 75ml/min
Surtout si diabète,
cardiopathie
et/ou protéinurie



Bloqueurs du SRA

si HTA ou protéinurie
Précautions : doses croissantes,
surveillance, créatininémie, kaliémie

Objectif TA < 130/80mmHg
Objectif RAC < 300mg/g



- Sel < 5g/jour
- Moins de protéines
- Éviter les néphrotoxiques*
- Activité physique
- Lutte contre le surpoids
- STOP Tabac

Manger-Bouger
Contrôler les facteurs de risque
cardio-vasculaire

*AINS, produits de contraste iodés

En plus du bloqueur du SRA,
je mets l'accent sur chacun
des objectifs d'hygiène de vie
et je prescris des nouveaux
traitements.

Bibliographie

Bien maîtriser la maladie rénale chronique pour agir tôt.

La Revue du Praticien. Juin 2024 ; Tome 74 ; N°6

Haute Autorité de Santé - Guide du parcours de soins Maladie rénale chronique de l'adulte (MRC) : bit.ly/has_mrc

The KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease (CKD) : bit.ly/kdigo_ckd

Obstacles and opportunities for albuminuria testing on the basis of the perspective of primary care: A qualitative study.

Oude Engberink A, Marc J, Renk E, Serayet P, Bourrel G, Moranne O.

Clin J Am Soc Nephrol. 2024 Nov 21

General practitioners' representation of early-stage CKD is a barrier to adequate management and patient empowerment: a phenomenological study.

Oude Engberink A, Tessier G, Kamil I, Bourrel G, Moranne O.

J Nephrol. 2024 Mar;37(2):379-390.

Maladie rénale chronique
Je dépiste simplement,
je protège efficacement



Accès à la **version**
numérique
du document